

AVERTISSEMENTS agricoles



GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 17 DU 19 AOUT 1991

SPECIAL BETTERAVES

Maladies : 1ers symptômes d'oïdium
Noctuelles : quelques dégâts

MALADIES

Situation : apparition des premiers symptômes d'oïdium.
Ramulariose et Rouille : situation encore saine.

N.B : des dégâts liés à une bactérie, *Aphanomyces aptata*, peuvent parfois être confondus avec des symptômes de Ramulariose. Ils sont rares, mais ont déjà été observés dans la région.

Préconisation : UN TRAITEMENT EST A CE JOUR INDISPENSABLE. Préférer un fongicide polyvalent, à action systémique, dont la persistance d'action est d'au moins 45 jours :

- ALTO BS 1 l/ha
- IMPACT 1 l/ha
- IMPACT R 1 l/ha
- ou RM 0,8 l/ha
- GEYSER 0,5 l/ha
- PUNCH CS 0,5 l/ha


Le PENNSUC (1 l/ha) peut également être employé, mais présente une meilleure efficacité appliqué en préventif.

NOCTUELLES DEFOLIATRICES

Situation : Des attaques de noctuelles sont couramment observées :

====> Chenilles vertes provoquant des perforations dans le feuillage.

Préconisation : En cas de très fortes attaques, un insecticide composé de pyréthrinioïde est à appliquer en soirée.
Les larves de ce papillon sortent, en effet, surtout la nuit.



ministère de l'agriculture et de la forêt



D.R.A.F. - S.R.P.V.
Cité Administrative - 59048 LILLE CEDEX - Tél. 20.52.00.25

STATION REGIONALE : (dont Avertissements Agricoles)
Z.A.L. du Grand Mont - Rue B. Palissy - B.P. 47 - 62750 LOOS-EN-GOHELLE - Tél. 21.28.27.27

7272

Abonnement
annuel :
A l'ordre
Régisseur de Recettes
D.R.A.F. Nord-Pas-de-Calais
ISSN 0758-7988 - CPPAP N°1885 AD